



Icterícia Neonatal

O que você precisa saber:

A icterícia neonatal é caracterizada pela coloração amarelada da pele e das escleras (a parte branca dos olhos) do recém-nascido, causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. Esse quadro é geralmente identificado através de exames de sangue.

Tratamento:

- **Fototerapia:** O tratamento mais comum consiste em expor o recém-nascido a uma fonte de luz fluorescente azul, branca ou solar. Durante a fototerapia, os olhos do bebê são protegidos, garantindo sua segurança. Quanto mais tempo o bebê permanece sob a luz, mais rápido se dá a melhora do quadro.

Prevenção:

- Amamentação precoce: Iniciar a amamentação o quanto antes é essencial.
- Amamentação exclusiva e em grande quantidade: Garantir que o bebê receba leite materno de forma exclusiva e frequente.
- Observar a eliminação do mecônio: O mecônio é a primeira evacuação do bebê e observar sua eliminação é importante.
- Mensurar o peso: Monitorar o peso do recém-nascido para assegurar que ele está se desenvolvendo adequadamente.



📍 Av. Jamil Feres Kfoury, 60, Jardim Panorama,
São José do Rio Preto – SP

☎ (17) 3201-5000 🌐 www.hcmriopreto.com.br